

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**EFFECTIVIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL
AUTOCUIDADO DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CON
TUBERCULOSIS PULMONAR. PUESTO DE SALUD
"MIRAFLORES ALTO". CHIMBOTE, 2012**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL
DE LICENCIADA(O) EN ENFERMERÍA**

TESISTAS:

GONZALES VILLAR, Segundo Américo

MARCOS ARGOMEDO, Carmen Sonia

ASESORA:

Ms. RODRÍGUEZ BARRETO, Yolanda

NUEVO CHIMBOTE - PERÚ

2013

RESUMEN

El presente trabajo de investigación es tipo cuantitativo – cuasiexperimental tiene por objetivo general conocer la efectividad del cuidado de enfermería en el autocuidado del familiar del paciente con tuberculosis pulmonar del puesto de salud “Miraflores Alto”, Chimbote 2012. La población estuvo constituida por 21 familiares con pacientes con tuberculosis pulmonar que reunieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos: Cuestionario sobre autocuidado a la familia del paciente con tuberculosis, Proceso de cuidado de enfermería en el autocuidado del familiar, el procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística paramétrica de T Student y la prueba estadística no paramétrica, de independencia de criterios (Chi cuadrado X^2), llegándose a las siguientes conclusiones:

- Antes de la aplicación de los cuidados de enfermería el 52,4% de los familiares mostraron un adecuado autocuidado y el 47,6% de las familiares restantes un inadecuado autocuidado
- Después de la aplicación de los cuidados de enfermería el 76,2% de las familiares en el Pos test 1 mostraron un adecuado autocuidado, sin embargo en el Pos test 2 el 100,0% mostró este nivel de autocuidado.
- Los cuidados de enfermería, en cuanto a la efectividad cuantitativa obtuvo mediante la T Student un efectividad significativa (post test 1 $p= 0.003$ y en el Pos test 2 un $p = 0,000$) incrementando positivamente el nivel de autocuidado de familiar, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa

Los cuidados de enfermería, en cuanto a la efectividad cualitativa se obtuvo un nivel de significancia entre el pre test y los pos test de (post test 1, $p=0.107$ y Pos test 2 un $p = 0,000$) y entre los pos test($p=0.017$) incrementándose el autocuidado del familiar del paciente con tuberculosis, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa

Palabra clave: Cuidados de enfermería, autocuidado de familiar, Tuberculosis.